Laktose-Intoleranz-Test

Der Laktose-Intoleranz-Test prüft, ob der Darm Milchzucker (Laktose) verwerten kann.

Laktose - ein Zweifachzucker (Disaccharid) - gelangt mit der Nahrung in den Dünndarm. Im Dünndarm wird die Laktose im Normalfall von einem Enzym namens Laktase in seine zwei Bestandteile Glukose (Traubenzucker) und Galaktose zerlegt.

Diese werden vom Körper aufgenommen und erhöhen den Zuckerspiegel des Blutes. Kann der Körper die Laktose nicht verwerten, fehlt der Blutzuckeranstieg.

Bei einem Laktose-Tolleranz-Test wird die in den Körper aufgenommene Glukosemenge anhand des Blutzuckerspiegels nach 30, 60, 90 und 120 Minuten bestimmt.

Liegt ein Mangel an Laktase vor, steigt der Blutzuckerspiegel nicht oder nur gering an. Häufig treten zusätzlich Beschwerden wie Blähungen, Krämpfe oder Durchfall auf. In diesen Fällen liegt eine Lactosemalabsorption vor.

Ihr Nutzen

Der Lactose-Intoleranz-Test ist ein diagnostischen Verfahren zum **Nachweis** einer **Lactosemalabsorption**. Gerne beraten wir Sie im Anschluss, wie Sie Ihre **Beschwerden zeitnah minimieren** können.

Lactoseintoleranz Gentest

Beim Lactoseintoleranz Gen Test wird über einen Abstrich der Wangenschleimhaut festgestellt ob eine Dispositon (Neigung) zu einer Lactoseunverträglichkeit besteht.

Häufig tritt diese erst mit 50 Jahren auf, dies erklärt sich aus der nachlassenden Enzymaktivität.

Die Kosten des Tests belaufen sich auf ca.60,00 € und sind keine Kassenleistung.